


Região Edafoclimática de Adaptação (REC)



Características

Tipo de crescimento: indeterminado

Cor da flor: branca

Cor da pubescência: cinza

Cor do hilo: marrom-claro

Teor médio de proteína: 37,1%

Teor médio de óleo: 22,1%

Acamamento: resistente

Altura média de planta: 99 cm

Peso médio de 1.000 sementes: 161 g

Potencial de ramificação: alto

Reação a doenças

A reação das cultivares às doenças é avaliada conforme descrito nas páginas 10, 11 e 12.

Cancro da haste	Resistente
Mancha olho-de-rã	Moderadamente resistente
Oídio	Moderadamente suscetível**
Podridão parda da haste	Suscetível
Podridão radicular de Phytophthora	Resistente*
Mosaico comum da soja	Resistente
Vírus da necrose da haste	Suscetível
Nematoide de galha <i>Meloidogyne incognita</i>	Suscetível
Nematoide de galha <i>Meloidogyne javanica</i>	Moderadamente resistente
Nematoide de cisto	Resistente (Raça 3)

*Teste para resistência de campo. **Avaliação de campo.

Destaques

- Desempenho e estabilidade nas regiões de baixa altitude da Macrorregião 2;
- Permite semeadura antecipada, encaixando no sistema em sucessão/rotação da 2ª safra;
- Moderada resistência ao nematoide de galha *M. javanica*.

Época de semeadura, População de plantas e Ciclo

Esses atributos de lavoura podem variar em razão do clima, solo e manejo, mas em geral seguem os limites apresentados na tabela abaixo.

Região Edafoclimática de Adaptação (REC)	Altitude (m)	SET			OUT			NOV			DEZ		Ciclo (dias)		
		2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s			
		Número de plantas finais por metro*													
201	PR (Oeste e Centro-Oeste)	Até 600	14	14	13	12	12	12	12	12	12	13	13	118 a 130	
		Acima 600	13	13	12	12	12	11	11	11	11	11	12		12
	PR (Norte); SP (Médio Paranaíba)	Até 600			14	13	12	12	12	12	12	12	13		
		Acima 600			13	13	12	12	12	11	11	11	11		12
202	PR (Nordeste); SP (Sudoeste); MS (Sul)	Até 600			15	14	12	12	12	12	13	13	14	14	116 a 124
203	SP (Centro Sul e Centro Oeste)	Até 600			15	14	12	12	12	12	13	13	14	14	117 a 126
		Acima 600			14	13	12	12	12	12	13	13	13	14	
204	MS (Centro-Sul e Sudoeste)	Até 600			15	13	13	12	12	12	13	13	13		113 a 120
		Acima 600		14	14	13	12	12	11	11	12	12	13		
301	MS (Centro-Norte); GO (Sudoeste)	Até 600			15	14	14	14	14	14	15	15		110 a 124	
		Acima 600			14	13	13	13	13	13	13	14	15		120 a 130

Onde 1s = 1ª semana; 2s = 2ª semana; etc. | * Espaçamento entrelinhas de 45 cm. ■ Preferencial ■ Tolerada

Exigência em Fertilidade do solo

Baixa

Média

Alta

Fora das épocas preferenciais de semeadura, posicionar a cultivar somente em solos de alta fertilidade. Na página 13 há explanações sobre fertilidade do solo.

ANOTAÇÕES
