


## Região Edafoclimática de Adaptação (REC)



## Características

Tipo de crescimento: indeterminado

Cor da flor: roxa

Cor da pubescência: cinza

Cor do hilo: marrom-claro

Teor médio de proteína: 37,3 %

Teor médio de óleo: 22,3 %

Acamamento: resistente

Altura média de planta: 98 cm

Peso médio de 1.000 sementes: 181 g

Potencial de ramificação: médio

## Reação a doenças

A reação das cultivares às doenças é avaliada conforme descrito nas páginas 10, 11 e 12.

Cancro da haste	Resistente
Mancha "olho-de-rã"	Moderadamente resistente
Oídio	Moderadamente resistente*
Podridão parda da haste	Resistente**
Podridão radicular de <i>Phytophthora</i>	Resistente*
Mosaico comum da soja	Resistente
Vírus da necrose da haste	Resistente
Nematoide de galha <i>Meloidogyne incognita</i>	Suscetível
Nematoide de galha <i>Meloidogyne javanica</i>	Moderadamente resistente
Nematoide de cisto	Suscetível

\*Teste de resistência de campo. \*\*Avaliação de campo.

## Destaques

- Alto potencial produtivo com estabilidade;
- Encaixa no sistema de sucessão/rotação de uma 2ª safra, com adaptação para semeadura antecipada em regiões que possibilitam esse sistema;
- Na REC 201 do PR, maior potencial produtivo em altitudes acima de 600 m.

## Época de semeadura, População de plantas e Ciclo

Esses atributos de lavoura podem variar em razão do clima, solo e manejo, mas em geral seguem os limites apresentados na tabela abaixo.

Região Edafoclimática de Adaptação (REC)		Altitude (m)	SET			OUT				NOV				DEZ		Ciclo (dias)	
			2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s		
		Número de plantas finais por metro*															
102	SC (Oeste e Nordeste); PR (Sudoeste)	Até 600		15	15	14	14	13	13	13	13	13	13	14	14	15	117 a 126
		Acima 600	14	14	13	13	13	12	12	10	10	12	12	13	14		
103	SC (Centro-Norte e Serra Geral); PR (Centro-Sul)	Acima 600			14	14	13	13	11	11	11	11	12	12	14	113 a 124	
		PR (Nordeste); SP (Sul)	Acima 600		15	14	13	13	13	12	12	12	12	13	13		15
201	PR (Oeste e Centro-Oeste)	Acima 600	15	14	14	14	13	13	12	12	12	12	13	15		118 a 124	
		PR (Norte); SP (Médio Paranapanema)	Acima 600		15	15	15	14	14	14	13	13	13	14	15		15

Onde 1s = 1ª semana; 2s = 2ª semana; etc. | \* Espaçamento entrelinhas de 45 cm. ■ Preferencial ■ Tolerada

### Exigência em Fertilidade do solo

Baixa

Média

Alta

Na página 13 há explicações sobre fertilidade do solo.

## ANOTAÇÕES