


Região Edafoclimática de Adaptação (REC)



Características

Tipo de crescimento: indeterminado

Cor da flor: roxa

Cor da pubescência: cinza

Cor do hilo: preta imperfeita

Teor médio de proteína: 36,8 %

Teor médio de óleo: 22,9 %

Acamamento: resistente

Altura média de planta: 95 cm

Peso médio de 1.000 sementes: 171 g

Potencial de ramificação: médio

Reação a doenças

A reação das cultivares às doenças é avaliada conforme descrito nas páginas 10, 11 e 12.

Cancro da haste	Resistente
Mancha "olho-de-rã"	Suscetível
Oídio	Moderadamente resistente**
Podridão parda da haste	Moderadamente resistente**
Podridão radicular de <i>Phytophthora</i>	Resistente*
Mosaico comum da soja	Resistente
Vírus da necrose da haste	Suscetível
Nematoide de galha <i>Meloidogyne incognita</i>	Suscetível
Nematoide de galha <i>Meloidogyne javanica</i>	Moderadamente resistente
Nematoide de cisto	Suscetível

*Teste para resistência de campo. **Avaliação de campo.

Destaques

- Alta performance com estabilidade nas regiões acima de 500 m, da macrorregião 2;
- Permite semeadura antecipada, encaixando no sistema em sucessão/rotação da 2ª safra;
- Moderada resistência ao nematoide de galha *M. javanica*.

Época de semeadura, População de plantas e Ciclo

Esses atributos de lavoura podem variar em razão do clima, solo e manejo, mas em geral seguem os limites apresentados na tabela abaixo.

Região Edafoclimática de Adaptação (REC)		Altitude (m)	SET			OUT				NOV				DEZ		Ciclo (dias)
			2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	
			Número de plantas finais por metro*													
102	SC (Oeste e Nordeste); PR (Sudoeste)	Até 600		14	14	13	13	12	12	12	12	12	13	14		127 a 133
		Acima 600		14	13	13	12	11	11	11	11	11	12	13	13	
103	SC (Centro-Norte e Serra Geral); PR (Centro-Sul)	Até 600		14	13	13	12	11	11	11	11	11	12	13	13	127 a 138
		Acima 600		14	14	13	13	12	12	12	12	12	13	14		
201	PR (Oeste e Centro-Oeste)	Até 600		16	15	14	14	13	13	13	13	13			116 a 137	
		Acima 600	15	15	14	13	13	12	12	11	11	11				
	PR (Norte); SP (Médio Parapanema)	Até 600				15	14	13	13	13	13	13				
		Acima 600		16	15	14	12	12	12	12	12	12				
202	PR (Nordeste); SP (Sudoeste); MS (Sul)	Até 600				16	15	15	15	15	15	15			101 a 121	
203	SP (Centro-Sul e Centro-Oeste)	Até 600				16	15	15	15	15	15	15			109 a 119	
		Acima 600			16	15	14	14	14	14	14	14				
204	MS (Centro-Sul e Sudoeste)	Até 600			16	15	14	14	14	14	14	14			102 a 115	
		Acima 600		16	15	14	13	13	13	13	13	13				
301	MS (Centro-Norte); GO (Sudoeste)	Até 600			20	20	18	18	18	18	18	18	18	18	20	98 a 104
		Acima 600		20	20	18	18	18	18	17	17	17	17	18	20	
303	MG (Triângulo e Alto Paranaíba); GO (Sudeste)	Até 600			20	20	18	18	18	18	18	18	18	18	20	109 a 117
		Acima 600		20	20	18	18	18	18	17	17	17	17	18	20	
304	GO (Leste); MG (Nordeste) e DF	Acima 600		20	20	18	18	18	18	17	17	17	17	18	20	108 a 116

Onde 1s = 1ª semana; 2s = 2ª semana; etc. | * Espaçamento entrelinhas de 45 cm. ■ Preferencial ■ Tolerada

Exigência em Fertilidade do solo

Baixa

Média

Alta

Na página 13 há explicações sobre fertilidade do solo.