


Região Edafoclimática de Adaptação (REC)



Características

Tipo de crescimento: determinado

Cor da flor: branca

Cor da pubescência: cinza

Cor do hilo: marrom-claro

Teor médio de proteína: 37,1 %

Teor médio de óleo: 22,1 %

Acamamento: moderadamente resistente

Altura média de planta: 80 cm a 110 cm

Peso médio de 1.000 sementes: 165 g

Potencial de ramificação: alto

Reação a doenças

A reação das cultivares às doenças é avaliada conforme descrito nas páginas 10, 11 e 12.

Cancro da haste	Resistente
Mancha "olho-de-rã"	Resistente
Oídio	Moderadamente resistente**
Podridão parda da haste	Moderadamente resistente**
Podridão radicular de <i>Phytophthora</i>	Moderadamente resistente*
Mosaico comum da soja	Resistente
Vírus da necrose da haste	Suscetível
Nematoide de galha <i>Meloidogyne incognita</i>	Resistente
Nematoide de galha <i>Meloidogyne javanica</i>	Suscetível
Nematoide de cisto	Suscetível

*Teste para resistência de campo. **Avaliação de campo.

Destaques

- Excelente potencial produtivo, principalmente nas regiões abaixo de 700 m e também em áreas com a presença do nematoide de galha *Meloidogyne incognita*.

Época de semeadura, População de plantas e Ciclo

Esses atributos de lavoura podem variar em razão do clima, solo e manejo, mas em geral seguem os limites apresentados na tabela abaixo.

Região Edafoclimática de Adaptação (REC)		Altitude (m)	SET		OUT				NOV				DEZ		Ciclo (dias)
			3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	
			Número de plantas finais por metro*												
201	PR (Oeste e Centro-Oeste)	Até 600				13	13	13	12	12	12	13			117 a 128
		Acima 600				12	11	11	10	10	11	12			
	PR (Norte); SP (Médio Paranapanema)	Até 600				13	13	13	12	12	12	13			
		Acima 600				12	12	12	11	11	11	12			
202	PR (Noroeste); SP (Sudoeste); MS (Sul)	Até 600				14	14	13	13	13	13	14			113 a 120
203	SP (Centro-Sul e Sudoeste)	Até 600				15	14	14	13	13	13	14			116 a 125
		Acima 600				14	13	13	11	11	12	13			
204	MS (Centro-Sul e Sudoeste)	Até 600				13	13	13	12	12	13	13			113 a 120
		Acima 600				12	12	12	11	11	12	12			
301	MS (Centro-Norte); GO (Sudoeste)	Até 600					17	17	16	16	16	17			107 a 111
		Acima 600					16	15	15	15	15	15			
302	SP (Norte); MG (Vale do Rio Grande); GO (Sul)	Até 600					17	17	16	16	16	17			105 a 110
		Acima 600					16	16	15	15	15	16			
303	MG (Triângulo e Alto Paranaíba); GO (Sudeste)	Até 600					17	17	16	16	16	17			107 a 114
		Acima 600					16	16	15	15	15	16			
401	GO (Centro)	Até 600					18	18	17	17	17	18			109 a 115
		Acima 600					17	17	16	16	16	17			

Onde 1s = 1ª semana; 2s = 2ª semana; etc. | * Espaçamento entrelinhas de 45 cm. ■ Preferencial ■ Tolerada

Exigência em Fertilidade do solo

Baixa

Média

Alta

Fora das épocas preferenciais de semeadura, posicionar a cultivar somente em solos de alta fertilidade. Na página 13 há explicações sobre fertilidade do solo.