


Região Edafoclimática de Adaptação (REC)



Características

Tipo de crescimento: indeterminado

Cor da flor: branca

Cor da pubescência: cinza

Cor do hilo: marrom-claro

Teor médio de proteína: 36,6 %

Teor médio de óleo: 22,7 %

Acamamento: resistente

Altura média de planta: 89 cm

Peso médio de 1.000 sementes: 147 g

Potencial de ramificação: alto

Reação a doenças

A reação das cultivares às doenças é avaliada conforme descrito nas páginas 10, 11 e 12.

| | |
|---|---------------------------|
| Cancro da haste | Resistente |
| Mancha "olho-de-rã" | Resistente |
| Oídio | Moderadamente resistente* |
| Podridão parda da haste | Resistente* |
| Podridão radicular de <i>Phytophthora</i> | Resistente |
| Mosaico comum da soja | Resistente |
| Vírus da necrose da haste | Resistente |
| Nematoide de galha <i>Meloidogyne incognita</i> | Suscetível |
| Nematoide de galha <i>Meloidogyne javanica</i> | Moderadamente resistente |
| Nematoide de cisto | Suscetível |

*Avaliação de campo.

Destaques

- Alta performance produtiva com previsibilidade;
- Ótima opção de refúgio para áreas de soja INTACTA, com grupo de maturidade relativa entre 5.7 e 6.1;
- Alto potencial de ramificação, com estabilidade de porte.

Época de semeadura, População de plantas e Ciclo

Esses atributos de lavoura podem variar em razão do clima, solo e manejo, mas em geral seguem os limites apresentados na tabela abaixo.

| Região Edafoclimática de Adaptação (REC) | | Altitude (m) | SET | | OUT | | | | NOV | | | | DEZ | | Ciclo (dias) | |
|--|--|-------------------------|-------------------------------------|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|--------------|-----------|
| | | | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | |
| | | | Número de plantas finais por metro* | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | SC (Oeste e Nordeste); PR (Sudoeste) | Até 600 | | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | | 124 a 127 |
| | | Acima 600 | 16 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | |
| 103 | SC (Centro-Norte e Serra Geral); PR (Centro-Sul) | Acima 600 | | | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 123 a 130 |
| | | PR (Nordeste); SP (Sul) | Acima 600 | | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 |
| 201 | PR (Oeste e Centro-Oeste) | Acima 600 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | | 125 a 131 |
| | PR (Norte); SP (Médio Paranapanema) | Acima 600 | | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | |

Onde 1s = 1ª semana; 2s = 2ª semana; etc. | * Espacamento entre linhas de 45 cm. | Preferencial | Tolerada

Exigência em Fertilidade do solo

Baixa

Média

Alto

Fora das épocas preferenciais de sementeira, posicionar a cultivar somente em solos de alta fertilidade. Na página 13 há explicações sobre fertilidade do solo.

ANOTAÇÕES