


## Região Edafoclimática de Adaptação (REC)



## Características

- Tipo de crescimento: determinado
- Cor da flor: branca
- Cor da pubescência: cinza
- Cor do hilo: marrom-claro
- Teor médio de proteína: 39,3 %
- Teor médio de óleo: 20,1 %
- Acamamento: moderadamente resistente
- Altura média de planta: 83 cm
- Peso médio de 1.000 sementes: 144 g
- Potencial de ramificação: alto

## Reação a doenças

A reação das cultivares às doenças é avaliada conforme descrito nas páginas 10, 11 e 12.

Cancro da haste	Resistente
Mancha "olho-de-rã"	Resistente
Oídio	Moderadamente resistente*
Podridão parda da haste	Resistente*
Podridão radicular de phytophthora	Resistente
Mosaico comum da soja	Resistente
Nematoide de galha <i>Meloidogyne incognita</i>	Moderadamente resistente
Nematoide de galha <i>Meloidogyne javanica</i>	Resistente
Nematoide de cisto	Suscetível

\*Avaliação de campo.

## Destaques

- Alto potencial produtivo com estabilidade;
- Performance superior em áreas com infestação de nematoides de galhas (*M. incognita* e *M. javanica*);
- Alto teor de proteína;
- Possui tolerância ao complexo de percevejos que atacam a soja – Tecnologia Block®.

## Época de semeadura, População de plantas e Ciclo<sup>1</sup>

Região Edafoclimática de Adaptação (REC)		Altitude (m)	OUT				NOV				DEZ		Ciclo (dias)		
			4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s		2s	
201	PR (Oeste e Centro-Oeste)	Até 600			14	14	13	13	13	13	14	14			117 a 127
		Acima 600			13	13	12	12	12	12	13	13			
	PR (Norte); SP (Médio Paranapanema)	Até 600			14	14	13	13	13	13	14	14			
		Acima 600			13	13	12	12	12	12	13	13			
202	PR (Noroeste); SP (Sudoeste); MS (Sul)	Até 600			15	15	14	14	14	14	14	15			116 a 125
204	MS (Centro-Sul e Sudoeste)	Até 600			14	14	13	13	13	13	14	14			102 a 106
		Acima 600			13	13	12	12	12	12	12	12			

Onde 1s = 1ª semana; 2s = 2ª semana; etc. | \* Espaçamento entrelinhas de 45 cm. ■ Preferencial ■ Tolerada

### Exigência em Fertilidade do solo<sup>2</sup>

Baixa

Média

Alta

Nota 1: Atributos de lavoura que podem variar em razão do clima, solo e manejo.

Nota 2: Fora das épocas preferenciais de semeadura, posicionar a cultivar somente em solos de alta fertilidade. Na página 13 há explanações sobre fertilidade do solo.

## ANOTAÇÕES

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---