


Região Edafoclimática de Adaptação (REC)



Características

Tipo de crescimento: indeterminado
Cor da flor: branca
Cor da pubescência: cinza
Cor do hilo: marrom-claro
Teor médio de proteína: 38,7 %
Teor médio de óleo: 21,7 %
Acamamento: resistente
Altura média de planta: 98 cm
Peso médio de 1.000 sementes: 155 g
Potencial de ramificação: alto

Reação a doenças

A reação das cultivares às doenças é avaliada conforme descrito nas páginas 10, 11 e 12.

Cancro da haste	Resistente
Mancha "olho-de-rã"	Moderadamente resistente
Oídio	Moderadamente resistente*
Podridão parda da haste	Resistente*
Podridão radicular de phytophthora	Resistente
Mosaico comum da soja	Resistente
Vírus da necrose da haste	Suscetível
Nematoide de galha <i>Meloidogyne incognita</i>	Suscetível
Nematoide de galha <i>Meloidogyne javanica</i>	Suscetível
Nematoide de cisto	Suscetível

*Avaliação de campo.

Destaques

- Alta performance com estabilidade produtiva, principalmente para as regiões baixas e quentes (abaixo de 600m);
- Melhor potencial produtivo em semeaduras antecipadas, permitindo semeadura da 2ª safra;
- Ótima opção de refúgio para áreas de soja INTACTA, com grupo de maturidade relativa entre 6.6 e 7.0;
- Resistência à Podridão Radicular de Phytophthora.

Época de semeadura, População de plantas e Ciclo¹

Região Edafoclimática de Adaptação (REC)		Altitude (m)	SET			OUT				NOV				Ciclo (dias)
			2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	
		Número de plantas finais por metro*												
201	PR (Oeste e Centro-Oeste)	Até 600	13	13	12	12	12	11	11	11	11			120 a 143
		Acima 600	12	12	11	11	11	11	10	10	10			
	PR (Norte); SP (Médio Paranapanema)	Até 600			14	12	12	12	12	11	11			
		Acima 600		13	12	11	11	10	10	10	10			
202	PR (Nordeste); SP (Sudoeste); MS (Sul)	Até 600				14	13	13	13	12	12	12	105 a 124	
203	SP (Centro-Sul e Sudoeste)	Até 600				14	14	13	13	12	12	12	119 a 129	
		Acima 600			14	13	13	12	12	12	11	11		
204	MS (Centro-Sul e Sudoeste)	Até 600			14	13	12	12	12	11	11		109 a 117	
		Acima 600	14	13	12	12	11	11	10	10	10			

Onde 1s = 1ª semana; 2s = 2ª semana; etc. | * Espaçamento entrelinhas de 45 cm. ■ Preferencial ■ Tolerada

Exigência em Fertilidade do solo²

Baixa

Média

Alta

Nota 1: Atributos de lavoura que podem variar em razão do clima, solo e manejo.

Nota 2: Fora das épocas preferenciais de semeadura, posicionar a cultivar somente em solos de alta fertilidade. Na página 13 há explicações sobre fertilidade do solo.

ANOTAÇÕES
