


Região Edafoclimática de Adaptação (REC)



Características

Tipo de crescimento: indeterminado

Cor da flor: roxa

Cor da pubescência: cinza

Cor do hilo: preta imperfeita

Teor médio de proteína: 37,2%

Teor médio de óleo: 22,1%

Acamamento: moderadamente resistente

Altura média de planta: 106 cm

Peso médio de 1.000 sementes: 164 g

Potencial de ramificação: médio

Reação a doenças

A reação das cultivares às doenças é avaliada conforme descrito nas páginas 10, 11 e 12.

Cancro da haste	Resistente
Mancha olho-de-rã	Moderadamente resistente
Oídio	Moderadamente resistente*
Podridão parda da haste	Sem informação
Podridão radicular de Phytophthora	Resistente
Mosaico comum da soja	Resistente
Vírus da necrose da haste	Tolerante
Nematoide de galha <i>Meloidogyne incognita</i>	Suscetível
Nematoide de galha <i>Meloidogyne javanica</i>	Suscetível
Nematoide de cisto	Resistente (Raça 3)

*Avaliação de campo.

Destaques

- Alta performance produtiva, adaptada a diferentes ambientes de produção;
- Permite semeadura antecipada, possibilitando o encaixe em sistemas de sucessão/rotação de culturas;
- Excelente opção de refúgio para cultivares com a tecnologia I2X com GMR entre 6.0 e 6.4.

Época de semeadura, População de plantas e Ciclo

Esses atributos de lavoura podem variar em razão do clima, solo e manejo, mas em geral seguem os limites apresentados na tabela abaixo.

Região Edafoclimática de Adaptação (REC)	Altitude (m)	SET			OUT				NOV				DEZ		Ciclo (dias)	
		2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s		
		Número de plantas finais por metro*														
201	PR (Oeste e Centro-Oeste)	Até 600	15	15	15	14	14	13	12	12	12	12	13	15	15	122 a 135
		Acima 600	15	14	14	14	12	12	11	11	11	11	12	14		
	PR (Norte)	Até 600			15	15	14	14	14	13	13	13	14	15		
		Acima 600		15	14	14	13	13	12	11	11	12	12	13	15	
202	MS (Sul)	Até 600			15	14	14	14	14	14	14	14	15		116 a 122	
203	SP (Centro-Sul e Sudoeste)	Até 600			15	14	14	14	14	14	14	14	15		115 a 120	
		Acima 600		15	14	14	13	13	12	11	11	12	12	13		15
204	MS (Centro-Sul e Sudoeste)	Até 600			15	15	15	14	14	14	13	13	13	14	15	105 a 115
		Acima 600	16	15	14	14	13	13	12	12	12	12	13	13	15	
301	MS (Centro-Norte); GO (Nordeste)	Até 600			18	18	18	18	16	16	16	17	17	17	18	106 a 115
		Acima 600		18	18	17	17	17	15	15	15	15	16	16	18	
304	GO (Leste); MG (Nordeste e DF)	Acima 600		18	18	17	17	17	15	15	15	15	16	16	18	110 a 112
401	GO (Centro)	Até 600			18	18	18	18	16	16	16	17	17	17	18	109 a 113
		Acima 600		18	18	17	17	17	15	15	15	15	16	16	18	

Onde 1s = 1ª semana; 2s = 2ª semana; etc. | * Espaçamento entrelinhas de 45 cm. ■ Preferencial ■ Tolerada

Exigência em Fertilidade do solo

Baixa

Média

Alta

Fora das épocas preferenciais de semeadura, posicionar a cultivar somente em solos de alta fertilidade. Na página 13 há explicações sobre fertilidade do solo.

ANOTAÇÕES
