




Região Edafoclimática de Adaptação (REC)



Características

Tipo de crescimento: indeterminado

Cor da flor: roxa

Cor da pubescência: cinza

Cor do hilo: marrom-claro

Teor médio de proteína: 35,2%

Teor médio de óleo: 23,3%

Acamamento: moderadamente resistente

Altura média de planta: 93 cm

Peso médio de 1.000 sementes: 179 g

Potencial de ramificação: alto

Reação a doenças

A reação das cultivares às doenças é avaliada conforme descrito nas páginas 10, 11 e 12.

Cancro da haste	Resistente
Mancha olho-de-rã	Resistente
Oídio	Moderadamente resistente**
Ferrugem-asiática	Resistente (lesão RB***)
Podridão parda da haste	Resistente**
Podridão radicular de Phytophthora	Resistente*
Mosaico comum da soja	Suscetível
Nematoide de galha <i>Meloidogyne incognita</i>	Suscetível
Nematoide de galha <i>Meloidogyne javanica</i>	Moderadamente resistente
Nematoide de cisto	Suscetível

*Teste para resistência de campo; ** Avaliação de campo; ***Lesão RB ("Reddish-Brown" marrom-avermelhada, caracteriza reação de resistência)

Destaques

- Cultivar com alto potencial produtivo e estabilidade;
- Permite semeadura antecipada, viabilizando a semeadura do milho safrinha na melhor época, nas regiões de indicação da cultivar na macrorregião sojícola 2;
- Cultivar com as Tecnologias Shield® e Block®, garantindo maior sustentabilidade na lavoura.

Época de semeadura, População de plantas e Ciclo

Esses atributos de lavoura podem variar em razão do clima, solo e manejo, mas em geral seguem os limites apresentados na tabela abaixo.

Região Edafoclimática de Adaptação (REC)	Altitude (m)	SET			OUT				NOV				DEZ		Ciclo (dias)	
		2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s		
		Número de plantas finais por metro*														
101	Até 600			16	14	14	14	13	12	12	12	14				133 a 144
	Acima 600			15	13	13	12	12	11	11	11	13				
102	Até 600		13	13	12	11	11	10	10	10	10	11	12	13	121 a 129	
	Acima 600				12	11	10	9	9	9	9	10	10	11		
103	Acima 600				12	11	10	9	9	9	9	10	10	11	124 a 132	
	Acima 600		13	13	12	11	11	10	10	10	10	11	12	13		
201	Até 600	15	14	13	13	12	12	11	11	11	12				109 a 124	
	Acima 600	13	13	12	12	11	11	10	10	10	10	12				
202	Até 600				14	14	13	13	13	13	13	13			105 a 111	
	Acima 600				14	14	13	12	12	12	12					
203	Até 600				14	14	13	12	12	12	12				108 a 112	
	Acima 600			13	13	13	12	12	12	11	11					
204	Até 600	15	14	13	12	12	12	11	11	12				105 a 112		
	Acima 600	13	13	12	11	11	10	10	10							

Onde 1s = 1ª semana; 2s = 2ª semana; etc. | * Espaçamento entrelinhas de 45 cm. ■ Preferencial ■ Tolerada

Exigência em Fertilidade do solo

Baixa Média Alta

Fora das épocas preferenciais de semeadura, posicionar a cultivar somente em solos de alta fertilidade. Na página 13 há explanações sobre fertilidade do solo.

ANOTAÇÕES