


## Região Edafoclimática de Adaptação (REC)



## Características

Tipo de crescimento: determinado

Cor da flor: branca

Cor da pubescência: cinza

Cor do hilo: marrom-claro

Teor médio de proteína: 39,3 %

Teor médio de óleo: 20,1 %

Acamamento: moderadamente resistente

Altura média de planta: 83 cm

Peso médio de 1.000 sementes: 144 g

Potencial de ramificação: alto

## Reação a doenças

A reação das cultivares às doenças é avaliada conforme descrito nas páginas 10, 11 e 12.

Cancro da haste	Resistente
Mancha "olho-de-rã"	Resistente
Oídio	Moderadamente resistente*
Podridão parda da haste	Resistente*
Podridão radicular de <i>Phytophthora</i>	Resistente
Mosaico comum da soja	Resistente
Nematoide de galha <i>Meloidogyne incognita</i>	Moderadamente resistente
Nematoide de galha <i>Meloidogyne javanica</i>	Resistente
Nematoide de cisto	Suscetível

\*Avaliação de campo.

## Destaques

- Alto potencial produtivo com estabilidade;
- Performance superior em áreas com infestação de nematoides de galhas (*M. incognita* e *M. javanica*);
- Alto teor de proteína;
- Possui tolerância ao complexo de percevejos que atacam a soja – Tecnologia Block®.

## Época de semeadura, População de plantas e Ciclo

Esses atributos de lavoura podem variar em razão do clima, solo e manejo, mas em geral seguem os limites apresentados na tabela abaixo.

Região Edafoclimática de Adaptação (REC)		Altitude (m)	OUT					NOV				DEZ		Ciclo (dias)
			4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	
201	PR (Oeste e Centro-Oeste)	Até 600			14	14	13	13	13	14	14			117 a 127
		Acima 600			13	13	12	12	12	13	13			
	PR (Norte); SP (Médio Paranapanema)	Até 600			14	14	13	13	13	14	14			
		Acima 600			13	13	12	12	12	13	13			
202	PR (Noroeste); SP (Sudoeste); MS (Sul)	Até 600			15	15	14	14	14	14	15		116 a 125	
204	MS (Centro-Sul e Sudoeste)	Até 600			14	14	13	13	13	14	14		102 a 106	
		Acima 600			13	13	12	12	12	12	12			

Onde 1s = 1ª semana; 2s = 2ª semana; etc. | \* Espaçamento entrelinhas de 45 cm. ■ Preferencial ■ Tolerada

### Exigência em Fertilidade do solo

Baixa

Média

Alta

Fora das épocas preferenciais de semeadura, posicionar a cultivar somente em solos de alta fertilidade. Na página 13 há explicações sobre fertilidade do solo.

## ANOTAÇÕES